

Notfallplan

Ruhe bewahren - Gefahrensituation einschätzen - Selbstschutz beachten

Zustand des Tieres

1) Akute Lebensgefahr

Sofortmaßnahmen:

- Reanimation (Beatmung, Herzmassage)
- Blutung stillen

2) Keine akute Lebensgefahr

Schock Gefahr gegeben:

- Hund zudecken
- Beruhigend einwirken

3) Keine akute Lebensgefahr

Keine Schock Gefahr gegeben

In allen 3 Fällen - WICHTIG:

- Transportfähigkeit herstellen (nach Absprache mit einem Tierarzt)
- Tierrettung anrufen
- Transport zum Tierarzt /Tierspital

Selbstschutz

Sehr wichtig ist der bereits erwähnte Selbstschutz. Verletzte und ängstliche Hunde können starke Abwehrreaktionen zeigen, die unter "normalen Bedingungen" unüblich sind.

Bei fremden (auf der Straße, im Wald gefundenen) Hunden ist auch die Gefahr einer Infektion nicht zu unterschätzen.

Im Idealfall ist eine zweite Person anwesend, die helfen kann, das Tier zu beruhigen und zu fixieren.

Gleichfalls ist das Anlegen eines Beißkorbes anzuraten.

Steht kein Beißkorb zur Verfügung, kann eine Maulbinde angelegt werden.

Dazu kann man ein Dreieckstuch, eine Stoff-Hundeleine oder ein ähnliches Material verwenden.

- Man hält die Leine (oder ähnliches) in beiden Händen und formt eine **große Schlinge** in der Luft
- Diese Schlinge wird dem Hund mit dem **Knoten nach oben** über das Maul gelegt und sanft zugezogen
- Die beiden Enden, werden **unter das Hundemaul** geführt und dort nochmals verknotet

Nicht angewandt werden darf eine Maulbinde bei:

- Bewusstlosigkeit
- Herz-Kreislaufbeschwerden
- Atembeschwerden
- Nasenbluten
- Erbrechen
- Hitzschlag
- Verletzungen am Kopf oder Maul

Atemstillstand

Ist erkennbar durch kein Heben oder Senken der Rippen und Flanken.

Sofortmaßnahmen:

- Bei Atemstillstand durch Hitzschlag: den Hund mit kaltem Wasser übergießen (nicht anzuwenden bei einem Schock Zustand)
- Mund-zu-Nase-Beatmung durchführen

Mund-zu-Nase-Beatmung - Erklärung:

- Maul schließen
- Kopf überstrecken
- Mit dem Mund vorsichtig Luft in die Nase einblasen, bis sich der Brustkorb hebt
- Frequenz: ca. 1x in 2 Sekunden

Herzstillstand

Ist zu erkennen, wenn kein Herzschlag an der linken Brustwand fühlbar bzw. kein Pulsschlag an der Innenseite der Oberschenkel tastbar ist.

Die Schleimhäute verfärben sich bläulich-lila.

Sofortmaßnahme:

- Herzmassage

Herzmassage - Erklärung:

- Bei kleinen Hunden umfasst die Hand den Brustkorb, wobei der Daumen auf der linken Brustseite liegt
- Bei mittleren Hunden, Handballen auf die linke Brustwandseite
- Bei großen Hunden, beide Hände auf die linke Brustwandseite
- Frequenz: ca. 2x pro Sekunde
 - 5x Drücken, 2x Beatmen im Wechsel, nach 5 Zyklen Pulskontrolle